



INSTRUCCIONS POSTOPERATÒRIES

Per a Sling.

CALDRÀ QUE:

- Mantingui la posició correcta: l'articulació del colze haurà de ser en angle recte (90°) i la mà alineada amb el braç.
- Protegir la pell a els punts de pressió i/o fricció del Sling (coll, sota pit, etc.).
- Realitzi els exercicis de mobilitat prescrits pel traumatòleg.
- Mantingui una correcta higiene i hidratació de la pell.

EVITARÀ:

- Recolzar-se damunt el braç afectat a sobre de qualsevol superfície.

RECOMANACIONS

- Consultarà al seu metge si s'observa canvis de coloració, inflor i/o augment del dolor.
- Comprovar periòdicament que la col·locació del Sling sigui la correcte, sobretot quan s'aixequi del llit.
- Segueixi les instruccions del fullet explicatiu.

EN CAS DE DOLOR MOLT INTENS S'HA DE DIRIGIR A:

L'HOSPITAL DE REFERÈNCIA



Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu al vostre metge.



INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Para Sling.

SERÁ PRECISO QUE:

- Mantenga una postura correcta: La articulación del codo ha de estar en ángulo recto (90°) y la mano alineada con el brazo.
- Proteja la piel en los puntos de presión y/o roce del Sling (cuello, debajo del pecho, etc. .).
- Realice los ejercicios de movilidad prescritos por el traumatólogo.
- Mantenga la piel limpia e hidratada.

EVITARÁ:

- Apoyar el brazo afectado sobre cualquier superficie.

RECOMENDACIONES:

- Consultará a su médico si se observan cambios de coloración, hinchazón y/o aumento de dolor.
- Compruebe periódicamente que el Sling esté bien colocado, sobretodo al levantarse de la cama.
- Siga las instrucciones del folleto explicativo.

EN CASO DE DOLOR MUY INTENSO SE TIENE QUE DIRIGIR AL:
HOSPITAL DE REFERENCIA



Para cualquier duda que tenga, consulte con su médico.